

# 注意報

長崎県病虫害防除所長

令和6年度病虫害発生予察 注意報第3号

## 果樹共通 カメムシ類 (チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ)

1. 発生地域 (対象地域) 県下全域

2. 発生程度 多

3. 注意報発令の根拠

- (1) 本年の越冬量は、平年よりやや多い (0.77頭/m<sup>2</sup>、平年 0.3頭/m<sup>2</sup>、令和6年3月15日付け令和5年度発生予察防除情報第19号より)。
- (2) フェロモントラップにおける誘殺数は、諫早市では4月3半旬および6半旬に飛来の増加が確認され、平年より誘殺数が多く、西海市でも4月3半旬に平年より多い誘殺数が確認されている (図1)。

また、誘殺数の増加は、例年より早い。




図1 チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(フェロモントラップ)

#### 4. 防除対策

- (1) 飛来時期や飛来数は園によって差があるので、こまめに見廻って早期発見に努め、飛来を認めたら早急に防除する。
- (2) ハウス栽培では、開口部を防虫網（4mm 目以下）で被覆し、侵入を防ぐ。被覆済みのハウスでは、防虫網の破損がないか点検・補修する。
- (3) なし等では袋かけ作業が遅れないようにする。
- (4) 収穫時期の近い品目は農薬使用基準に留意する。

---

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

（長崎県病害虫防除所）ホームページ」アドレス：<https://www.jpnn.ne.jp/nagasaki/>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

（長崎県病害虫防除所） T E L : 0957-26-0027

